

Dirección General Marítima Dimar

Centro de Investigaciones Oceanográficas  
e Hidrográficas del Pacífico CCCP

# MONITOREO CONDICIONES ENOS PACÍFICO CENTRAL ORIENTAL

No.  
**65** Junio  
2018



ISSN 2339-4277  
(En Línea)



Ministerio de Defensa Nacional

**Dimar**  
Dirección General Marítima  
Autoridad Marítima Colombiana



Centro de Investigaciones  
Oceanográficas e Hidrográficas  
del Pacífico

[www.dimar.mil.co](http://www.dimar.mil.co)

Monitoreo Condiciones ENOS  
Pacífico Central Oriental  
No. 65/Junio del 2018

Una publicación digital de  
El Centro de Investigaciones Oceanográficas e  
Hidrográficas del Pacífico Colombiano (CCCP)  
[www.cccp.org.co](http://www.cccp.org.co)  
Teléfonos: +57 (2) 727 6059 - 727 2637 Tumaco,  
Colombia y la Dirección General Marítima (Dimar)  
[www.dimar.mil.co](http://www.dimar.mil.co)  
Teléfonos: +57 (1) 220 0490 Bogotá, Colombia

Ministerio de Defensa  
Dirección General Marítima  
Subdirección de Desarrollo Marítimo

## DIRECCIÓN

Contralmirante Mario Germán Rodríguez Viera  
Director General Marítimo Dimar

Capitán de Navío Hernando García Gómez.  
Coordinador General Dimar

Capitán de Navío José Manuel Plazas Moreno  
Subdirector de Desarrollo Marítimo

Capitán de Fragata Carlos Martínez Ledesma  
Director CCCP

## CONTENIDOS

Teniente de Navío Diego Fernando Salguero Londoño  
Responsable del Área de Oceanografía Operacional

Suboficial Tercero Wilberth Steban Forero Wagner  
Responsable Sección Oceánica CCCP

Marinero segundo Keny David Quintero Paz  
Auxiliar Sección Oceánica CCCP

## COORDINACIÓN EDITORIAL

Angélica María Castrillón Gálvez  
Editora de Publicaciones Dimar

Paula Andrea Rodríguez Campos  
Publicista Dimar

## EDITORIAL DIMAR

### Fotografía

Archivo Fotográfico Dimar

Edición en línea: ISSN 2339-4277



Monitoreo Condiciones ENOS Pacífico Central Oriental por CCCP-Dimar se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 3.0 Unported

EL MONITOREO CONDICIONES ENOS PACÍFICO CENTRAL ORIENTAL es una publicación institucional del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP) y la Dirección General Marítima (Dimar). Es de carácter técnico, investigativo e informativo; emitido mensualmente y dirigido al sector marítimo, a la comunidad científica y académica. La información y conceptos expresados en esta publicación deben ser utilizados por los interesados bajo su responsabilidad y criterio. Sin embargo, se entiende que cualquier divergencia con lo publicado es de interés del CCCP y de Dimar, por lo que agradecemos el envío de sus correspondientes sugerencias. Este producto intelectual está protegido por el *Copyright* y cuenta con una política de acceso abierto para su consulta. Sus condiciones de uso están definidas por el licenciamiento *Creative Commons* (CC), que expresa de antemano los derechos definidos por el CCCP y Dimar



## ÍNDICE

<b>1</b>	<b>Diagnóstico de las condiciones ENOS</b>	<b>3</b>
1.1	Resultado de los monitores de agencias internacionales .....	4
1.2	Condiciones monitoreadas por el CCCP .....	10
<b>2</b>	<b>Parámetros meteorológicos, en los principales puertos del Pacífico colombiano</b>	<b>14</b>
2.1	Bahía Solano .....	14
2.2	Buenaventura .....	14
2.3	Tumaco .....	14
<b>3</b>	<b>Pronóstico de las condiciones El niño oscilación sur (ENOS)</b>	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>Conclusiones</b>	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>Referencias</b>	<b>17</b>

## ÍNDICE DE FIGURAS

<b>Figura 1.</b> Evolución de las anomalías de temperatura subsuperficial (a) en el Océano Pacífico Ecuatorial (OPE) y superficiales (b) entre latitudes 5°S y 5°N para el periodo comprendido entre el 8 de mayo y el 22 de junio del 2018. La escala de colores representa la magnitud de las anomalías en °C. Fuente: Climate Prediction Center-NOAA.....	4
<b>Figura 2.</b> Anomalías de TSM en el Océano Pacifico Tropical para el periodo comprendido entre el 03 de junio y el 30 de junio del 2018. La escala de colores representa la magnitud en °C. Fuente: Climate Prediction Center – NOAA.....	5
<b>Figura 3.</b> Anomalías semanales de TSM en el Océano Pacífico Tropical para el periodo comprendido entre el 06 y el 30 de junio del 2018. Fuente: Climate Prediction Center-NOAA. ....	5
<b>Figura 4.</b> Evolución de las anomalías en la TSM monitoreadas en las regiones Niño 4, 3.4, 3 y 1+2 de la NOAA. Los valores ubicados en el eje Y, representan las magnitudes de las anomalías en °C. Fuente: Climate Prediction Center-NOAA. ....	6
<b>Figura 5.</b> Anomalías de nivel del mar Océano Pacífico Tropical para el mes de junio del 2018. La escala de colores representa la magnitud media en metros (m) (Fuente: Copernicus Marine Service (CMEMS), Procesamiento: CIOHP).....	7
<b>Figura 6.</b> Anomalías de nivel del mar CPC, junio del 2018 (Fuente: Copernicus.....	7
<b>Figura 7.</b> Anomalías campos de vientos sobre el Océano Pacífico Ecuatorial (OPE) para el periodo comprendido entre el 31 de mayo y el 29 de junio del 2018. Fuente: Climate Prediction Center-NOAA.....	8
<b>Figura 8.</b> Anomalías Radiación de Onda Larga (OLR, por sus siglas en inglés) Para el periodo comprendido entre el 02 y el 27 de junio del 2018. La escala de colores representa en W/m <sup>2</sup> . Fuente: Climate Prediction Center-NOAA.....	8
<b>Figura 9.</b> Evolución de las Ondas Oceánicas Kelvin de Hundimiento y Afloramiento, en el Océano Pacífico Ecuatorial (OPE). La escala de colores representa la magnitud de las anomalías en °C. Fuente: Climate Prediction Center-NOAA.....	9

# Contenido

<b>Figura 10.</b> Ubicación geográfica de la estación costera fija de Tumaco en el Pacífico colombiano (02°00'00"N - 78°48'00"W). Fuente ODV. ....	10
<b>Figura 11.</b> Serie temporal de temperatura del agua en la estación costera fija de Tumaco entre 0 a 80 metros de profundidad, para el periodo de comprendido entre diciembre del 2017 y junio del 2018. La escala de colores representa la magnitud de la temperatura medida en °C. Fuente: CCCP.....	11
<b>Figura 12.</b> Perfil de temperatura para el mes de junio del 2018 registrado en la estación costera fija de Tumaco. En color rojo se presenta el perfil obtenido en la primera quincena del mes y en azul el realizado a finales del mismo. Fuente: CCCP. ....	11
<b>Figura 13.</b> Serie temporal de salinidad del agua en la estación costera fija de Tumaco entre 0 a 80 metros de profundidad, para el periodo de comprendido entre diciembre del 2017 y junio del 2018. Fuente: CCCP. ....	12
<b>Figura 14.</b> Perfil de salinidad para el mes de junio del 2018 en la estación costera fija de Tumaco. En color rojo se presenta el perfil obtenido en la primera quincena del mes y en azul el realizado a finales del mismo. Fuente: CCCP.....	12
<b>Figura 15.</b> Comportamiento del Índice Multivariado de Tumaco (IMT) para el periodo comprendido entre diciembre del 2017 y junio del 2018. Fuente: CCCP. ....	13
<b>Figura 16.</b> Predicción modelos estadísticos y dinámicos de condiciones ENOS 18 de mayo del 2018.....	15

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Valores Índice Multivariado Tumaco (IMT) para el periodo comprendido entre los años 2014 y 2018. En color rojo se presentan Condiciones cálidas, en Color azul condiciones frías y en color negro condiciones neutrales (Fuente: CCCP). ....	13
---	----

## RESUMEN EJECUTIVO

Con base información suministrada por el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), mensualmente el Área de Oceanografía Operacional del CCCP, realiza un diagnóstico de las condiciones El Niño Oscilación Sur (ENOS). Así mismo en una estación costera fija (02°00'00"N - 78°48'00"W), en el área jurisdiccional del Pacífico Colombiano, a través del desarrollo de perfiles con un Conductivity, Temperatura and Depth (CTD, por sus siglas en inglés), es posible conocer el comportamiento de la temperatura y la salinidad a lo largo de la columna de agua.

Durante el mes de junio en el Océano Pacífico Tropical se presentó valores sobre el rango considerado como normal, en especial entre los 0° y 10° N,

En las regiones “El Niño” al finalizar junio los valores semanales, al igual que el mes anterior, se presentaron sobre lo normal en todas la regiones, excepto en la región niño 1+2, donde presento valor negativo de -0.7°C, el valor más cálido se dio en la región niño 4 con +0.5C.


Las condiciones atmosféricas se caracterizaron por la presencia de una amplia franja de anomalías positivas de OLR (asociadas a la baja cobertura de nubes) han persistido alrededor de la línea de Fecha; mientras anomalía negativa de la OLR se han mantenido intermitentes en el extremo occidental del océano Pacífico y sobre la región de Indonesia. En cuanto a los vientos zonales (vientos en sentido este-oeste) cerca de la superficie del Pacífico ecuatorial (850hPa), desde principios de diciembre de 2017 hasta el presente, aparece la Oscilación Madden Julian (OMJ), contribuyendo a la propagación hacia el este de anomalías de viento de bajo nivel. Durante las últimas semanas, las anomalías del viento del oeste han persistido en el Pacífico oriental.

Con respecto al comportamiento de los perfiles de temperatura y salinidad en la estación costera fija de Tumaco, se observó un descenso paulatino de la termoclina en relación al mes anterior, por su parte la haloclina presentó un comportamiento similar, el cual se considera normal de acuerdo a la climatología local. Referente al Índice Multivariado de Tumaco (IMT) se presentó categoría “F1”, indicando fase fría neutra para esta zona del país.

# 1 DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES ENOS


## 1.1 Resultado de los monitores de agencias internacionales

Durante el periodo comprendido entre el 08 de mayo y el 22 de junio del 2018 se observó la aumento de las anomalías negativas de la temperatura subsuperficial del mar presentes en el oriente del Océano Pacífico Tropical (OPT), entre longitudes 110°O a 100°O y profundidades entre los 0 m y 30 m, con magnitudes de hasta 1°C. En el mes de se presentó una disminución de las anomalías positivas entre los 5m y 25m de profundidad, entre longitudes 90°E y 80°O, con magnitudes que alcanzaron los -2°C (Figura 1a). En relación a la Temperatura Superficial del Mar (TSM), en el mes de junio en comparación con el mes de mayo, se observa un aumento paulatino de las anomalías positivas que se extienden desde el centro del OPE hasta las costas suramericanas.(Figura 1b).




**Figura 1.** Evolución de las anomalías de temperatura subsuperficial (a) en el Océano Pacífico Ecuatorial (OPE) y superficiales (b) entre latitudes 5°S y 5°N para el periodo comprendido entre el 8 de mayo y el 22 de junio del 2018. La escala de colores representa la magnitud de las anomalías en °C. Fuente: Climate Prediction Center-NOAA.

La figura 2 nos muestra la persistencia de las anomalías positivas, presentes entre latitudes 8°N y 27°S, entre el centro y el oriente del OPE; así mismo se observa el aumento paulatino de las anomalías negativas presentes en la Cuenca Pacífica Colombiana (CPC), con magnitudes entre 0.0°C y -1.0°C. De manera más detallada, la figura 3 indica el comportamiento semanal de la TSM, en donde se observa las anomalías presentes cerca de las costas suramericanas entre los 10°N y 20°S; y el aumento de las anomalías positivas presentes en el centro y el oriente del OPE, con respecto al mes anterior.




**Figura 2.** Anomalías de TSM en el Océano Pacífico Tropical para el periodo comprendido entre el 03 de junio y el 30 de junio del 2018. La escala de colores representa la magnitud en °C. Fuente: Climate Prediction Center – NOAA.



**Figura 3.** Anomalías semanales de TSM en el Océano Pacífico Tropical para el periodo comprendido entre el 06 y el 30 de junio del 2018. Fuente: Climate Prediction Center-NOAA.

En la figura 4 se presentan las anomalías de TSM reportadas por la NOAA el 02 de julio del 2018 para las regiones Niño, donde se observan magnitudes positivas en una de ellas. Las regiones Niño 3= 0.4, 3.4= 0.4 y 4= 0.5 son las que presentan las anomalías más altas con magnitud, La región Niño 1+2, posee una magnitud de -0.7



**Figura 4.** Evolución de las anomalías en la TSM monitoreadas en las regiones Niño 4, 3.4, 3 y 1+2 de la NOAA. Los valores ubicados en el eje Y, representan las magnitudes de las anomalías en °C. Fuente: Climate Prediction Center-NOAA.



Las anomalías del nivel del mar sobre el OPE oscilaron entre -0.1 m y 0.3 m. A lo largo del mes de junio los registros anómalos positivos más representativos se agruparon en el centro del OPT, presentando valores entre 0.1 m y 0.3 m y en el oriente del OPE entre latitudes 4°N y 10°S, presentando valores entre 0.1 m y 0 m. (Figura 5). Por su parte, sobre la Cuenca Pacífica Colombiana (CPC), es posible evidenciar anomalías positivas, comprendidas entre 0.1 m y 0.25 m, siendo más bajas al noroeste de la CPC (Figura 6).




Figura 5. Anomalías de nivel del mar Océano Pacífico Tropical para el mes de junio del 2018. La escala de colores representa la magnitud media en metros (m) (Fuente: Copernicus Marine Service (CMEMS), Procesamiento: CIOHP).






Figura 6. Anomalías de nivel del mar CPC, junio del 2018 (Fuente: Copernicus Marine Service (CMEMS), Procesamiento: CIOHP).

Con respecto al comportamiento atmosférico, para las primeras semanas del mes de junio del 2018, se observó la presencia de vientos del este sobre el área centro y el oriente del Océano Pacífico Ecuatorial (OPE); así mismo, se observó la presencia de vientos del oeste sobre el occidente del OPE. Por su parte, para las ultimas semanas del mes, se evidenció la presencia de vientos del oeste sobre el centro y el occidente y la presencia de vientos del este sobre el oriente del OPE (Figura 7a). Los vientos en los niveles altos (200 hPa) mantuvieron una persistencia del oeste en gran parte del OPE, presentando mayores magnitudes sobre el norte, con valores superiores a los identificados en los niveles bajos (850 hPa) (Figura 7b). En relación a las anomalías de onda larga (la nubosidad asociada a convección), fueron evidentes magnitudes negativas en partes de indonesia; mientras que cerca de la línea de cambio de fecha, se presentaron regiones con anomalías positivas (convección suprimida y precipitación reducida) (Figura 8).




**Figura 7.** Anomalías campos de vientos sobre el Océano Pacífico Ecuatorial (OPE) para el periodo comprendido entre el 31 de mayo y el 29 de junio del 2018. Fuente: Climate Prediction Center-NOAA.



**Figura 8.** Anomalías Radiación de Onda Larga (OLR, por sus siglas en inglés) Para el periodo comprendido entre el 02 y el 27 de junio del 2018. La escala de colores representa en W/m<sup>2</sup>. Fuente: Climate Prediction Center-NOAA.


Como se puede observar en la gráfica se evidencio la propagación de ondas kelvin para el océano pacifico ecuatorial así: Desde mediados de agosto del 2017 hasta noviembre 2017, una onda Kelvin de afloramiento presentó temperaturas subsuperficiales por debajo del promedio en el Pacífico central y oriental. Desde febrero del 2018 hasta junio del 2018, se presentaron hundimientos con temperaturas subsuperficiales superiores al promedio.



**Figura 9.** Evolución de las Ondas Oceánicas Kelvin de Hundimiento y Afloramiento, en el Océano Pacífico Ecuatorial (OPE). La escala de colores representa la magnitud de las anomalías en °C. Fuente: Climate Prediction Center-NOAA.


## 1.2 Condiciones monitoreadas por el CCCP

Esta actividad es realizada por el Área de Oceanografía Operacional del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP) y consiste en el monitoreo quincenal de las condiciones oceanográficas de una estación costera fija ubicada en la ensenada de Tumaco ( $02^{\circ}00'00''N - 78^{\circ}48'00''W$ ), en área jurisdiccional del Pacífico colombiano (Figura 10). A través del desarrollo de perfiles con un *Conductivity, Temperatura and Depth* (CTD, por sus siglas en inglés), es posible conocer el comportamiento de la temperatura y salinidad a lo largo de la columna de agua. A este equipo oceanográfico es incorporado un sensor de oxígeno disuelto para tener una asociación de los perfiles con esta variable química.




**Figura 10.** Ubicación geográfica de la estación costera fija de Tumaco en el Pacífico colombiano ( $02^{\circ}00'00''N - 78^{\circ}48'00''W$ ). Fuente ODV.

### 1.2.1 Comportamiento del perfil de temperatura



**Figura 11.** Serie temporal de temperatura del agua en la estación costera fija de Tumaco entre 0 a 80 metros de profundidad, para el periodo de comprendido entre diciembre del 2017 y junio del 2018. La escala de colores representa la magnitud de la temperatura medida en °C. Fuente: CCCP.

Durante junio del 2018 se obtuvo un promedio mensual de la TSM de 27.13°C. La zona presentó una anomalía negativa de -0.45°C con respecto a la media histórica del mes (Figura 11). El muestreo realizado el 15 de junio (línea roja) presenta una termoclina entre los 35 y 45m mientras que en el segundo muestreo el 25 de junio del 2018 (línea azul), presenta una termoclina entre los 50 y 55m, valores de temperatura que oscilan entre los 16.2° y 27.24°C (0 y 80 m). Sin embargo los perfiles de temperatura del mes, con respecto al mes anterior, indican un descenso paulatino de la termoclina, ubicándose a profundidades entre los 40 m y 50 m. Este comportamiento se considera normal de acuerdo a la climatología local (Figura 12).



**Figura 12.** Perfil de temperatura para el mes de junio del 2018 registrado en la estación costera fija de Tumaco. En color rojo se presenta el perfil obtenido en la primera quincena del mes y en azul el realizado a finales del mismo. Fuente: CCCP.

### 1.2.2 Comportamiento del perfil de salinidad.




Figura 13. Serie temporal de salinidad del agua en la estación costera fija de Tumaco entre 0 a 80 metros de profundidad, para el periodo de comprendido entre diciembre del 2017 y junio del 2018. Fuente: CCCP.

Durante junio del 2018 se obtuvo un promedio de salinidad superficial del mar de 31.87. La zona presentó una anomalía negativa de 0.45 con respecto a la media histórica del mes (Figura 13).

Durante el primer muestreo realizado el 15 de junio del 2018 (línea roja), el perfil obtenido presenta una haloclina entre los 35 y 45 metros, mientras que para el segundo muestreo (línea azul) realizado el 25 de junio del 2018, la haloclina se ubicó entre los 50 y 55 metros. Sin embargo los perfiles de salinidad del mes, con respecto al mes anterior, indican un descenso paulatino de la haloclina. Este comportamiento se considera normal de acuerdo a la climatología local. Los registros de salinidad en la columna de agua oscilaron entre los 31.5 y 34.9 (0 y 80 m) (Figura 14).





Figura 14. Perfil de salinidad para el mes de junio del 2018 en la estación costera fija de Tumaco. En color rojo se presenta el perfil obtenido en la primera quincena del mes y en azul el realizado a finales del mismo. Fuente: CCCP.

### 1.2.3 Índice climático multivariado para la costa occidental de Colombia

Actualmente el Índice Multivariado de Tumaco (IMT) (Figura 15) presenta categoría “F1”, indicando fase fría neutra (-0.8) para esta zona del país. Se presenta disminución en los Valores Medios Mensuales de Temperatura Superficial del Mar (VMMTSM), en los Valores Medios Mensuales de Temperatura Ambiente (VMMTA) y aumento en los Valores Totales Mensuales de Precipitación (VTMP).

Con respecto a los meses anteriores, se observa la persistencia en los valores negativos que ha venido presentando el IMT. Por su parte se presenta una disminución paulatina en su magnitud.



**Figura 15.** Comportamiento del Índice Multivariado de Tumaco (IMT) para el periodo comprendido entre diciembre del 2017 y junio del 2018. Fuente: CCCP.

**Tabla 1.** Valores Índice Multivariado Tumaco (IMT) para el periodo comprendido entre los años 2014 y 2018. En color rojo se presentan Condiciones cálidas, en Color azul condiciones frías y en color negro condiciones neutrales (Fuente: CCCP).

AÑO	TRIMESTRE AÑO											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2014	0.27	0.33	-0.10	-0.03	-0.05	0.53	0.45	0.60	0.43	0.55	0.34	0.20
2015	0.01	-0.95	-0.75	-0.33	1.05	1.4	1.8	2.08	2.43	2.59	2.87	2.61
2016	1.92	0.79	-0.04	0.14	1.15	1.13	0.66	0.18	0.40	-0.17	-0.45	-0.28
2017	-0.15	-0.19	-0.36	0.46	0.86	0.75	0.34	0.30	0.35	-0.25	-0.83	-0.98
2018	-0.7	-0.50	-0.63	-0.78	-0.55	-0.8						

## **2 PARÁMETROS METEOROLÓGICOS, EN LOS PRINCIPALES PUERTOS DEL PACÍFICO COLOMBIANO**

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2018, las condiciones meteorológicas de los principales puertos del Pacífico Colombiano se describen a continuación.

### **2.1 Bahía Solano**

La Temperatura ambiente presentó un promedio de 26.35°C, evidenciándose una anomalía negativa de -0.70°C. El valor máximo registrado fue de 31.0°C y el valor mínimo de 22.5°C.

### **2.2 Buenaventura**

La Temperatura ambiente presentó un promedio de 26.2°C, evidenciándose una anomalía negativa de -0.42°C. El valor máximo registrado fue de 31.1°C y el valor mínimo de 22.9°C. El promedio mensual para la Humedad Relativa fue de 92.4%, con una anomalía negativa de -2.98%. El valor máximo registrado fue de 100% y el valor mínimo de 66%.

### **2.3 Tumaco**

La Temperatura ambiente presentó un promedio de 26.27°C, evidenciándose una anomalía negativa de -0.67. El valor máximo registrado fue de 29.4°C y el valor mínimo de 23.4°C. El promedio mensual de Humedad Relativa fue del 90.47%, con una anomalía negativa de -1.41%. El valor máximo registrado fue de 100% y el valor mínimo de 68%. Por su parte, el total de Precipitación observado fue de 142.1 mm, obteniendo una anomalía positiva de 134.8 mm.



### 3 PRONÓSTICO DE LAS CONDICIONES EL NIÑO OSCILACIÓN SUR (ENOS)

De acuerdo con los modelos dinámicos y estadísticos de las agencias internacionales, se espera un 90% de probabilidad de condiciones neutrales, un 8% de probabilidad de condiciones frías y un 2% de probabilidad de condiciones cálidas para el trimestre (MAY-JUN-JUL) del 2018. Los modelos concuerdan con una disminución de las probabilidades de fase neutra y un aumento en las probabilidades de condiciones cálidas para el tercer trimestre del 2018 (Figura 16).




Figura 16. Predicción modelos estadísticos y dinámicos de condiciones ENOS 18 de mayo del 2018. (Fuente: IRI/CPC).

## 4 CONCLUSIONES

Las condiciones características de la niña se desarrollaron a fines del 2017 manteniéndose en los primeros meses del 2018. Para el mes de mayo y junio las principales condiciones atmosféricas se debilitaron hasta alcanzar los niveles neutros y la temperatura subsuperficial del mar retornó a valores positivos. Durante el mes de junio en el Océano Pacífico Tropical se presentó valores sobre el rango considerado como normal, en especial entre los 0° y 10° N, En las regiones “El Niño” al finalizar junio los valores semanales, al igual que el mes anterior, se presentaron sobre lo normal en todas la regiones, excepto en la región niño 1+2, donde presento valor negativo de -0.7°C, el valor más cálido se dio en la región niño 4 con +0.5C. Los monitoreos realizados en el mes de junio del 2018 indican un leve descenso de la termoclina, alcanzando una profundidad de 50 metros. Este comportamiento es coherente con la dinámica semanal de la TSM registrada por la Climate Prediction Center-NOAA, para el periodo comprendido entre el 09 y el 30 de junio del 2018. El IMT por su parte, indica que localmente esta zona del país se encuentra en fase fría neutra, al presentar un coeficiente de -0.8.

A través de las mediciones efectuadas por medio de la Red de Medición de Parámetros Oceanográficos y de Meteorología Marina (REDPOMM) de Dimar, se observó que para el Litoral Pacífico Colombiano en general, se presentó un leve descenso en las magnitudes de temperatura ambiente; La temperatura sobre el litoral pacífico colombiano para el mes de junio, presento su mayor registro en la zona centro (Puerto de Buenaventura) con un valor máximo de 31.1 °C, el segundo registro más alto se presentó en la zona norte (Puerto de Bahía Solano) con una temperatura máxima de 31.0 °C y por último la zona sur (Puerto de Tumaco Nariño) presento el menor registro en las temperaturas máximas de 29.4 °C. Teniendo en cuenta la anterior se puede denotar claramente que la zona centro presento temperaturas mucho más altas que la zona sur con una diferencia de hasta de 1.7 °C.

## 5 REFERENCIAS

Discusión diagnóstica El Niño Oscilación del Sur (ENSO) National Weather Service/Climate Prediction Center. NOAA. Actualizado el 11 de enero del 2018. Consultado el 17-01-18. Disponible en: [http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis\\_monitoring/enso\\_advisory/](http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/)

CPC/IRI ENSO Update. El Niño/Southern Oscillation (ENSO) Diagnostic Discussion. Actualizado 15 de septiembre 2016. Consultado el 30-09-16. Disponible en: <http://portal.iri.columbia.edu/portal/server.pt?open=512&objID=945&PageID=0&cached=true&mode=2&userID=2>

Bonjean F. and G.S.E. Lagerloef, 2002: Diagnostic Model and Analysis of the Surface Currents in the Tropical Pacific Ocean, Journal of Physical Oceanography, Vol. 32, No. 10, pages 2938-2954.

Aviso+. AVISO+ Satellite Altimetry data. Obtenido de <http://www.aviso.altimetry.fr/>.

Copernicus Marine Environment Monitoring Service. Obtenido de <http://marine.copernicus.eu/>