



Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana
— Centro de Investigaciones Oceanográficas
e Hidrográficas del Pacífico

Boletín **Meteomarino** del Pacífico Colombiano

No. **117**
SEPTIEMBRE
2022

Mensual



CRÉDITOS

Boletín Meteomarinero
Mensual del Pacífico Colombiano
No. 117/ Septiembre del 2022

Una publicación digital del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP)

www.cccp.org.co

Teléfono +57 (2) 727 2637

San Andrés de Tumaco, Colombia
y la Dirección General Marítima (Dimar)

www.dimar.mil.co

Teléfonos +57 (1) 220 0490 Bogotá, Colombia.

Ministerio de Defensa
Dirección General Marítima
Subdirección de Desarrollo Marítimo

DIRECCIÓN

Vicealmirante John Fabio Giraldo Gallo
Director General Marítimo Dimar

Capitán de Navío
Edwin Antonio Parada Cabrera
Subdirector de Desarrollo Marítimo

Capitán de Fragata
Alexis Grattz Bonilla
Director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico.

El *Boletín Meteomarinero Mensual del Pacífico Colombiano* es una publicación del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CIOH-P) y la Dirección General Marítima (Dimar). Es de carácter técnico, investigativo e informativo; emitido mensualmente y dirigido al sector marítimo, y a la comunidad científica y académica, en idioma Español y en formato electrónico. La información y conceptos expresados en esta publicación deben ser utilizados por los interesados bajo su responsabilidad y criterio. Sin embargo, se entiende que cualquier divergencia con lo publicado es de interés del CCCP y de Dimar, por lo que se agradece el envío de sus correspondientes sugerencias. Este producto intelectual cuenta con el ISSN 2339-4080 edición en línea; está protegido por el Copyright y cuenta con una política de acceso abierto para su consulta. Sus condiciones de reconocimiento, uso y distribución están definidas por el licenciamiento Creative Commons (CC), que expresa de antemano los derechos definidos por el CCCP y Dimar.

CONTENIDOS

Marinero Primero

Rojas Mosquera Fabián Ernesto
Auxiliar Servicio Meteorológico Marino del Pacífico colombiano

Profesional de Defensa

Laura Marcela Vásquez López
Investigadora Área de Oceanografía Operacional

REVISIÓN

Suboficial Segundo

Edinson Andrés Guevara Pimiento
Responsable del Servicio Meteorológico del Pacífico

Teniente de Corbeta

William Andrés Rojas Durán
Encargado de la Sección de Oceanografía y Meteorología Operacional.

COORDINACIÓN EDITORIAL

Área de Comunicaciones Estratégicas
(Acoes - Dimar)

EDITORIAL DIMAR

Fotografía:

Archivo Fotográfico Dimar

Edición en línea: ISSN 2339-4080



Boletín Meteomarinero Mensual del Pacífico Colombiano por CCCP-Dimar se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 3.0 Unported



ÍNDICE

1	Introducción	5
2	Comportamiento general de la atmósfera en el Pacífico colombiano	6
3	Análisis de las condiciones meteorológicas sobre el litoral Pacífico colombiano en septiembre 2022.	8
3.1	Comportamiento de los principales parámetros meteorológicos en Bahía Solano (Chocó).	8
3.1.1	Temperatura ambiente.	8
3.1.2	Humedad relativa.....	9
3.1.3	Presión atmosférica.	10
3.1.4	Precipitación.	11
3.1.5	Velocidad del viento.....	12
3.1.6	Nivel del mar.	13
3.2	Comportamiento de los principales parámetros meteorológicos en Buenaventura (Valle del Cauca).....	14
3.2.1	Temperatura ambiente.	14
3.2.2	Humedad relativa.....	15
3.2.3	Presión atmosférica.	16
3.2.4	Precipitación	17
3.2.5	Velocidad y dirección del viento	18
3.2.6	Nivel del mar	19
3.3	Comportamiento de los principales parámetros meteorológicos en Tumaco (Nariño)	20
3.3.1	Temperatura ambiente	20
3.3.2	Humedad relativa.....	21
3.3.3	Presión atmosférica.	22
3.3.4	Precipitación	23
3.3.5	Velocidad y dirección del viento	24
3.3.6	Nivel del mar	25
4	Conclusiones	26
5	Referencias bibliográficas	28

Tabla de figuras

Figura 1. Serie de tiempo, histograma de frecuencia, anomalía y resumen estadístico mensual de la temperatura ambiente en Bahía Solano.....	8
Figura 2. Serie de tiempo, histograma de frecuencia, anomalía y resumen estadístico mensual de la humedad relativa en Bahía Solano.....	9
Figura 3. Serie de tiempo, histograma de frecuencia, anomalía y resumen estadístico mensual de la presión atmosférica en Bahía Solano.....	10
Figura 4. Serie de tiempo, histograma de frecuencia, anomalía y resumen estadístico mensual de la precipitación en Bahía solano.....	11
Figura 5. Distribución de frecuencia de la dirección, velocidad, anomalía velocidad y resumen estadístico del viento en Bahía Solano.....	12
Figura 6. Serie de tiempo y resumen estadístico mensual del nivel del mar en Bahía Solano.....	13
Figura 7. Serie de tiempo, histograma de frecuencia, anomalía y resumen estadístico mensual de la temperatura ambiente en Buenaventura.....	14
Figura 8. Serie de tiempo, histograma de frecuencia, anomalía y resumen estadístico mensual de la humedad relativa en Buenaventura.....	15
Figura 9. Serie de tiempo, histograma de frecuencia, anomalía y resumen estadístico mensual de la presión atmosférica en Buenaventura.....	16
Figura 10. Serie de tiempo, histograma de frecuencia, anomalía y resumen estadístico mensual de la precipitación en Buenaventura.....	17
Figura 11. Distribución de frecuencia de la dirección, velocidad, anomalía velocidad y resumen estadístico del viento en Buenaventura.....	18
Figura 12. Serie de tiempo, y resumen estadístico mensual del nivel del mar en Buenaventura.....	19
Figura 13. Serie de tiempo, histograma de frecuencia, anomalía y resumen estadístico mensual de la temperatura ambiente en Tumaco.....	20
Figura 14. Serie de tiempo, histograma de frecuencia, anomalía y resumen estadístico mensual de la humedad relativa en Tumaco.....	21
Figura 15. Serie de tiempo, histograma de frecuencia, anomalía y resumen estadístico mensual de la presión atmosférica en Tumaco.....	22
Figura 16. Días de lluvia, sumatoria precipitación acumulada, anomalía y resumen estadístico mensual de la precipitación en Tumaco.....	23
Figura 17. Distribución de frecuencia de la dirección, velocidad, anomalía velocidad y resumen estadístico del viento en Tumaco.....	24
Figura 18. Serie de tiempo y resumen estadístico mensual del nivel del mar en Tumaco.....	25

1 Introducción

El Boletín Meteomarino Mensual del Pacífico Colombiano, es una publicación elaborada por el Área de Oceanografía Operacional del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP), la cual realiza una descripción y análisis estadístico del comportamiento de los diferentes parámetros meteorológicos y oceánicos que definen el clima en la Cuenca Pacífica Colombiana (CPC). Para este fin, se realiza el análisis de los datos registrados durante el mes de estudio por la Red de Medición de Parámetros Oceanográficos y Meteorología Marina (REDMPOMM) de la Dirección General Marítima (Dimar). La red está conformada por Estaciones Meteorológicas y Mareográficas Automáticas Satelitales (EMMAS), ubicadas a lo largo del litoral Pacífico colombiano. En la Tabla 1, se muestra la ubicación geográfica de cada una de las estaciones EMMAS.

ESTACIONES METEOROLÓGICAS Y MAREOGRÁFICAS AUTOMÁTICAS SATELITALES (EMMAS)			
ITEM	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	LATITUD	LONGITUD
1	Tumaco	1° 49' 12.36" N	78°43' 43.32" W
2	Isla Gorgona	2° 57' 44.9994" N	78° 10' 23.5194"W
3	Isla Malpelo	4° 0' 9.36" N	81° 36' 15.4794" W
4	Juanchaco	3° 54' 54" N	77° 21' 33.12"W
5	Buenaventura	3° 53' 31.1994" N	77° 4' 55.1994"W
6	Bahía Malaga	3° 58' 21" N	77° 19' 39"W
7	Bahía Solano	6° 13' 58.08" N	77° 24' 42.84"W

Tabla 1. Información geográfica de la ubicación de las EMMAS en la CPC.

2 Comportamiento general de la atmósfera en el Pacífico colombiano

La ubicación geográfica de Colombia en la zona tropical hace que su territorio sea partícipe de las mayores proporciones de energía que el sol le transfiere a la Tierra. Justamente en los trópicos se absorbe la mayor parte de esta energía que luego se transfiere a la atmósfera, configurándose de esa forma en el motor que determina el desplazamiento del aire entre las regiones ecuatoriales y polares, mediante una circulación meridional (Uscategui, 1993).

Cerca de la superficie de la tierra, en la zona tropical, se desarrollan vientos provenientes del noreste y del sureste, denominados Alisios, como consecuencia del efecto Coriolis generado por la rotación terrestre en torno al eje que pasa por sus polos. El encuentro de estos vientos cerca al Ecuador obliga al aire cálido ecuatorial a elevarse, según la denominada rama ascendente de la celda de Hadley. Este movimiento ascendente provoca un enfriamiento del aire por expansión, condición que favorece la condensación y, por ende, el desarrollo de las nubes y de precipitaciones (Uscategui, 1993).

La migración de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) en el territorio colombiano, la influencia de los procesos océano-atmosféricos desarrollados en el Océano Pacífico, y la ubicación geográfica de la Serranía de Baudó y la Cordillera Occidental hace que la región Pacífica Colombiana sea uno de los lugares del planeta con mayor índice de precipitación anual (Franco H., 2005; Guzmán D., 2014). Esta región se caracteriza como tropical lluvioso isotermal, según la clasificación del modelo climático de Koeppen; lo que sugiere la presencia de precipitaciones durante todo el año y diferencias en la temperatura ambiente menores a 5°C, entre el mes más cálido y el mes más frío (Uscategui, 1993).

Esta dinámica, presente en los vectores de viento en la región, está asociada con fuerte actividad convectiva atmosférica. La climatología de vientos en la región indica un comportamiento estacional semestral. Durante el primer semestre, predominan los vientos Alisios del noroeste, con intensidades promedio entre los 5 y 7m/s-1; durante este período se manifiesta el denominado chorro de Panamá sobre la CPC (primer trimestre- invierno boreal), el cual genera vientos provenientes de la región Caribe que pasan a través de Panamá con dirección norte - sur, regulando las condiciones oceanográficas de la CPC (Chelton, D.B, 2000). En el segundo semestre, la ZCIT se ausenta de la CPC, al igual que el chorro de Panamá, presentándose predominio de vientos del suroeste del denominado chorro del Chocó sobre las áreas de estudio, este último contribuye a la advección de humedad por parte de los vientos fríos que interactúan con vientos más cálidos (alisios del este), causando alta inestabilidad atmosférica en la zona (Poveda G. & Mesa J,1999).

Las mareas, son las variaciones periódicas en el nivel del mar, generadas en primer lugar por la fuerza de atracción gravitacional entre el sistema Luna-Tierra-Sol, y en segundo lugar por aspectos océano-atmosféricos (Omar G. Lizano, 2006). El Pacífico colombiano experimenta mareas de tipo semidiurna, caracterizada por presentar dos pleamares y dos bajamares en un día lunar, con una ligera desigualdad entre ellas (IDEAM, 2019). Su amplitud varía a medida que la onda se propaga hacia aguas someras, como consecuencia de la conservación de energía, aumentando según la línea de costa, la extensión y la profundidad de la plataforma continental. De igual forma, se incrementa debido a la compresión lateral generada al interior de cuerpos de agua semi-cerrados, como es el caso de la Bahía de Buenaventura, por reflexión con los contornos o por fenómenos atmosféricos como campos de viento y presión (Omar G. Lizano, 2006). Los rangos mareales de los principales puertos al centro y sur de la cuenca pacífica colombiana, oscilan alrededor de 5,6 m en la Bahía de Buenaventura y de 4,45 m en la Bahía de Tumaco (Informe AMIZC red vertical, 2018).

Según Caicedo, Latandret y Portilla (2014) De acuerdo con el análisis de los datos de las boyas y los espectros del modelo del European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), el oleaje predominante en la Cuenca Pacífica colombiana (CPC) proviene del suroeste. Este oleaje está compuesto de trenes de olas de amplio periodo y moderadas alturas procedentes del océano abierto, que incrementan su altura sobre fondos someros y se refractan perdiendo su energía y cambiando la dirección. Las alturas medias de oleaje varían entre 0.5 y 1.5 m, con periodos que oscilan entre 8 y 10 s. Los datos analizados indican también la presencia de oleaje libre o de fondo (swell), proveniente del noroeste, especialmente en los meses del invierno Boreal.

3 Análisis de las condiciones meteorológicas sobre el litoral Pacífico colombiano en septiembre 2022.

3.1 Comportamiento de los principales parámetros meteorológicos en Bahía Solano (Chocó).

3.1.1 Temperatura ambiente.




Figura 1. Serie de tiempo, histograma de frecuencia, anomalía y resumen estadístico mensual de la temperatura ambiente en Bahía Solano.

3.1.2 Humedad relativa




Figura 2. Serie de tiempo, histograma de frecuencia, anomalía y resumen estadístico mensual de la humedad relativa en Bahía Solano

3.1.3 Presión atmosférica.




Figura 3. Serie de tiempo, histograma de frecuencia, anomalía y resumen estadístico mensual de la presión atmosférica en Bahía Solano.

3.1.4 Precipitación.





Figura 4. Serie de tiempo, histograma de frecuencia, anomalía y resumen estadístico mensual de la precipitación en Bahía Solano.


3.1.5 Velocidad del viento.



Resumen Estadístico	
Variable	Velocidad del Viento (nudos)
Media	2.9
Dirección predominante	Sureste
Máximo	13.6
Mínimo	0.2
Total Datos	4078
Promedio Multianual	3.0
Anomalías	-0.1

Figura 5. Distribución de frecuencia de la dirección, velocidad, anomalía velocidad y resumen estadístico del viento en Bahía Solano.

3.1.6 Nivel del mar.



Resumen Estadístico	
Variable	Nivel del Mar (m)
Media	2.1
Máximo	4.0
Mínimo	0.2
Total Datos	42078

Figura 6. Serie de tiempo y resumen estadístico mensual del nivel del mar en Bahía Solano.

3.2 Comportamiento de los principales parámetros meteorológicos en Buenaventura (Valle del Cauca)

3.2.1 Temperatura ambiente.




Figura 7. Serie de tiempo, histograma de frecuencia, anomalía y resumen estadístico mensual de la temperatura ambiente en Buenaventura.

3.2.2 Humedad relativa




Figura 8. Serie de tiempo, histograma de frecuencia, anomalía y resumen estadístico mensual de la humedad relativa en Buenaventura.

3.2.3 Presión atmosférica.




Figura 9. Serie de tiempo, histograma de frecuencia, anomalía y resumen estadístico mensual de la presión atmosférica en Buenaventura.

3.2.4 Precipitación





Figura 10. Serie de tiempo, histograma de frecuencia, anomalía y resumen estadístico mensual de la precipitación en Buenaventura.


3.2.5 Velocidad y dirección del viento



Resumen Estadístico	
Variable	Velocidad del Viento (nudos)
Media	4.7
Dirección predominante	Suroeste
Máximo	18.3
Mínimo	0.1
Total Datos	4245
Promedio Multianual	5.0
Anomalías	-0.3

Figura 11. Distribución de frecuencia de la dirección, velocidad, anomalía velocidad y resumen estadístico del viento en Buenaventura.

3.2.6 Nivel del mar



Resumen Estadístico	
Variable	Nivel del Mar (m)
Media	2.4
Máximo	4.7
Mínimo	-0.5
Total Datos	41187

Figura 12. Serie de tiempo, y resumen estadístico mensual del nivel del mar en Buenaventura.

3.3 Comportamiento de los principales parámetros meteorológicos en Tumaco (Nariño)

3.3.1 Temperatura ambiente




Figura 13. Serie de tiempo, histograma de frecuencia, anomalía y resumen estadístico mensual de la temperatura ambiente en Tumaco.

3.3.2 Humedad relativa




Figura 14. Serie de tiempo, histograma de frecuencia, anomalía y resumen estadístico mensual de la humedad relativa en Tumaco.

3.3.3 Presión atmosférica.




Figura 15. Serie de tiempo, histograma de frecuencia, anomalía y resumen estadístico mensual de la presión atmosférica en Tumaco.

3.3.4 Precipitación





Figura 16. Días de lluvia, sumatoria precipitación acumulada, anomalía y resumen estadístico mensual de la precipitación en Tumaco.


3.3.5 Velocidad y dirección del viento



Resumen Estadístico	
Variable	Velocidad del Viento (nudos)
Media	5.4
Dirección predominante	Suroeste
Máximo	21.2
Mínimo	0.2
Total datos	4315
Promedio multianual	5.3
Anomalías	0.1

Figura 17. Distribución de frecuencia de la dirección, velocidad, anomalía velocidad y resumen estadístico del viento en Tumaco.

3.3.6 Nivel del mar



Resumen Estadístico	
Variable	Nivel del Mar (m)
Media	1.8
Máximo	3.7
Mínimo	0.0
Total datos	43171

Figura 18. Serie de tiempo y resumen estadístico mensual del nivel del mar en Tumaco.

4 Conclusiones

1. Durante el mes de septiembre, la Cuenca del Pacífico Colombiano - CPC, se analizaron los datos de temperatura ambiente, obteniendo un promedio de 25,4°C en Bahía Solano, 25,5°C en Buenaventura y por último 25,3°C Tumaco. Estos promedios reflejan una gran similitud en el comportamiento general de la variable.

Por otro lado, la temperatura máxima difiere a consideración del promedio, donde Bahía Solano registra hasta 30,1°C, Buenaventura registra hasta 29,2°C y en Tumaco 28,1°C, la temperatura mínima obtenida para el mes, se encuentra en Bahía Solano y en Tumaco con 22,7°C, y Buenaventura con 23°C respectivamente.

2. La Cuenca del Pacífico Colombiano-CPC, continúan presentando como máximo de humedad relativa en Bahía Solano, Buenaventura del 100% y en Tumaco el 97% de porcentaje acorde con el clima del área en análisis. En cambio, el valor mínimo registrado difiere, ya que en Bahía Buenaventura y Tumaco registraron con el 73% mientras que Bahía Solano fue del 77%.

Además, con los datos obtenidos, se generó el promedio de esta variable meteorológica, donde Bahía Solano se evidencia un 98,5%, Buenaventura un 96,9% y en Tumaco con un 87,2%.

3. La presión atmosférica promedio presentada en Bahía Solano es de 1011 mbar, Buenaventura fue de 1011,1 mbar y en Tumaco 1009,7 mbar. Asimismo, el valor máximo de presión atmosférica para Bahía Solano fue de 1014,6 mbar, Buenaventura con un valor de 1015,4 mbar y la de Tumaco de 1013,7 mbar.

En cuanto a los registros mínimos de presión atmosférica para septiembre, se observó para los puertos de Bahía Solano, Buenaventura y Tumaco, los valores de 1006,5 mbar, 1005,9 mbar y 1005 mbar, respectivamente.

4. En Bahía Solano se presentó una precipitación acumulada de 67,3 mm y el día con mayor precipitación registró un acumulado del 20,4 mm. Buenaventura presentó una precipitación acumulada de 641 mm, la mayor registrada para septiembre en la CPC y el día con mayor precipitación logró un acumulado del 91,6 mm. Por otro lado, en Tumaco, la precipitación acumulada es del 80.7 mm, donde el día con mayor precipitación tiene una sumatoria de 24,4 mm. Además, la estación de Bahía Solano registró precipitaciones 30 días de septiembre, en Buenaventura 25 días y en Tumaco registraron precipitaciones en 20 días del mes, respectivamente.

5. El comportamiento del viento en Bahía Solano se presentó como dirección predominante al sureste, con velocidades máximas de 14,3 nudos, Buenaventura se presentó como dirección predominante al suroeste, con velocidades máximas de 18,8 nudos y para Tumaco, el viento predominó en dirección suroeste, con velocidades máximas de 14 nudos.

Además, la velocidad promedio del viento para Bahía Solano registro 2,8 Buenaventura registró 4,6 nudos y Tumaco reportó una velocidad promedio de 5,4 nudos.

6. Los datos registrados para el nivel del mar evidenciaron que en Bahía Solano el nivel máximo fue de 4,0 m, en el mínimo se registró un valor de 0,2 m, junto a una media de 2 m. En ese sentido, disminuyeron los niveles en relación con los valores reportados para el mes anterior.

En el caso de Buenaventura, el nivel máximo del mar registrado es de 4,7 m, el nivel mínimo es de 0,4 m y el promedio obtenido es de 2,4 m. Los datos reflejan un leve aumento de los niveles en relación con los valores reportados para el mes anterior.

Para Tumaco, el valor del nivel máximo del mar reportó un valor de 3,7 m, su nivel mínimo fue de 0 m y el valor promedio fue de 1,8 m. En este Puerto y en relación con los datos reportados en el mes de septiembre, se presentó un leve aumento en los niveles de acuerdo con los valores registrados anteriormente.

5 Referencias bibliográficas

Caicedo AL, Latandret S, Portilla J (2014). Modelización operacional de oleaje en el Pacífico colombiano. Bol. Cient. CIOH 2014; 32:71-84. Recuperado el 03 de septiembre de 2019, de https://www.cioh.org.co/dev/publicaciones/acceso_dev.php?nbol=cioh_bcc3205.pdf

Chelton, D.B., M.H. Freilich, and S.K. Esbensen. (2000). *Satellite Observations of the Wind Jets off the Pacific Coast of Central America. Part II: Regional Relationships and Dynamical Considerations. Mon. Wea. Rev.*, 128, 2019–2043, *Ciencia y Mar.* (2014). XXII (54): 61-62.

E.Rodriguez-Rubio y W. Schneider. (2003), *On the Seasonal Circulation within the Panama Bight derived from satellite observations of wind, altimetry and sea surface temperature, Chile: Centro de Investigacion Oceanografica en el Pacifico Sur-oriental (COPAS), Universidad de concepcion de Chile.*

Guzmán D.; Ruíz, J. F.; Cadena M. (2014). *Regionalización de Colombia según la estacionalidad de la precipitación media mensual, a través de Análisis de Componentes Principales (Acp)*, 21 p.

IDEAM (2019). *Pronóstico de Pleamares y Bajamares en la Costa Pacífica Colombiana 2019*. Recuperado el 06 agosto de 2019, de <http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/cartilla-pronostico-pleamares-bajamares-costa-pacifico-colombiana>

Lizano, Omar G. (2006). *Algunas características de las mareas en la costa Pacífica y Caribe de Centroamérica*. Consejo Nacional de Rectores, 51-64. Recuperado el 05 agosto de 2019, de: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cienciaytecnologia/article/view/2654>

Poveda G. y Mesa J.(1999). *La corriente del Chorro Superficial del Oeste (“del Chocó”) y otras dos corrientes de Chorro en Colombia: climatología y variabilidad durante las fases del ENSO*. Rev. Acad. Colomb. Cienc. 23(89): 517-528. ISSN 0370-3980.

Uscátegui A. (1993), *Hidrología e Hidrogeología de la Región Pacífica Colombiana*, Bogota: Leyve P.